

Belangrijke observaties

Tweerijige zegge, Pluimzegge, Hoge cyperzegge, Waterkruiskruid, Moeraskruiskruid, Blauwe knoop, Schildereprijs en Melkviooltje lijken in verspreiding te zijn afgenomen. Bij Blauwe knoop en Waterkruiskruid was er lokaal wel sprake van massale verjonging uit zaad. Mogelijk concentreren deze soorten zich op de voor hun optimale plekken.

De verschillen in soortensamenstelling tussen de percelen ten gevolge van het wel of niet opbrengen van maaisel en de herkomst van het maaisel lijken kleiner te worden. Knoopkruid kwam aanvankelijk alleen ten westen van het plankier voor, waar maaisel uit de Bennekomse Meent was opgebracht, maar heeft zich nu ook verder naar het oosten verspreid.

Een groot verschil tussen de ronden voor de inventariseerders was, dat in 2021 laarzen voor het veldwerk onontbeerlijk waren en bij de laatste ronden niet meer. In 2021 stonden de percelen voor een deel nog onder water, maar bij de latere rondes lagen de percelen tijdens de inventarisatieperiode (van half juli tot augustus) geheel droog. Ook de grondwaterstanden bij het weerstation de Veenkampen geven aan dat het grondwater bij iedere ronde lager stond. Vooralsnog lijkt het effect van de steeds lagere grondwaterstanden op de vegetatie echter nog beperkt te zijn. Mogelijk heeft het extreem natte tussenjaar 2024 het effect van verdroging enigszins getemperd. Wel bestond de indruk dat enkele soorten van voedselrijke omstandigheden zoals Tandzaad-soorten en Europese hanenpoot waren toegenomen, mogelijk als gevolg van het vrijkomen van nutriënten bij de afbraak van veen onder invloed van verdroging.

Tekst: Ruud Beringen